

คางคาวขอบหูขาวกลาง

- ลักษณะ :** ความยาวลำตัวและหัว 8-9 ซม. หางยาว 0.7-1.2 ซม. ลำแขนช่วงปลายยาว 6.5-7.5 ซม. มีดวงตาขนาดใหญ่ช่วยให้การมองเห็นในที่มืดดีขึ้น หูยาวไม่มีขนปกคลุม ขอบหูมีสีขาวยื่นตามลำตัวมีสีน้ำตาลเทา เฉพาะขนบริเวณคอค่อนข้างยาวสีน้ำตาลแดงเข้ม คางคาวตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าคางคาวตัวเมียเล็กน้อย
- เขตแพร่กระจาย :** ศรีลังกา อินเดีย พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค
- ที่อยู่อาศัย :** พบได้ทั้งในป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง
- อุปนิสัย :** อาศัยรวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆ ไม่เกิน 10 ตัว หลบนอนตามใต้ต้นไม้ โพรงไม้ ใต้ใบปาล์ม หรือตามปากถ้ำ ซึ่งมีความสูงเพียงพอให้ปลอดภัยจากศัตรู บางครั้งพบอาศัยห้อยหัวหลบนอนตามใต้หลังคาบ้าน มีความจำดีมาก สามารถจดจำบริเวณที่หาอาหารได้ ออกหากินเวลาใกล้ค่ำ มีมูกที่สามารถรับกลิ่นดอกไม้และผลไม้ได้ดีเป็นพิเศษ กินผลไม้และน้ำหวานดอกไม้ จึงช่วยแพร่พันธุ์ผลไม้ไปได้ไกลทั้งโดยเมล็ดและละอองเกสร ตกลูกครั้งละ 1 ตัว เวลาออกหากินมักจะนำลูกไปด้วย โดยให้ลูกเกาะติดที่หน้าอกแม่
- สถานภาพ :** พบชุกชุมในป่าสะแกราช



ค้างคาวขอบหูขาวกลาง

(ชื่ออื่น : ค้างคาวหน้าหมา)

Greater Short-nosed Fruit Bat

Cynopterus sphinx (Vahl, 1797)

Pteropodidae

Chiroptera