

อีเห็นขางลาย

- ลักษณะ :** ความยาวลำตัวและหัว 43-71 ซม. หางยาว 40-66 ซม. น้ำหนัก 2-5 กิโลกรัม ขนที่ไบน้หน้าเป็นสีดำ แต่มีลายสีขาวพาดขวางหน้าผากผ่านทางใต้หู มีจุดสีขาวตามล่างขอบตาและข้างๆ จมูก ส่วนขนตามลำตัวมีสีเทาเข้มเกือบดำ มีจุดเล็กๆ เรียงตัวกันเป็นทางยาว 3 เส้นจากไหล่ถึงโคนหาง ขนที่จมูก หูและปลายเท้าทั้ง 4 ข้างมีสีดำ
- เขตแพร่กระจาย :** พบในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทั่วทุกภาค
- ที่อยู่อาศัย :** อาศัยอยู่ได้ในสภาพพื้นที่ที่หลากหลาย ตั้งแต่ชายป่าใกล้พื้นที่เกษตรกรรมและชุมชน ไปจนถึงป่าดิบแล้งและป่าเต็งรังที่รกทึบ ในป่าสะแกราชมักพบอีเห็นขางลายอาศัยอยู่ในโพรงต้นไม้หรือตามซอกง่ามกิ่งไม้ขนาดใหญ่ ตามป่ากริมลำธารหรือป่าดิบแล้ง
- อุปนิสัย :** ออกหากินตามลำพังในเวลากลางคืน โดยอาศัยและหากินบนต้นไม้มากกว่าตามพื้นดิน อีเห็นกินอาหารได้หลายประเภท ตั้งแต่ผลไม้สุก แมลง นกเล็กๆ สัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กจนถึงซากสัตว์
- สถานภาพ :** พบได้บ่อยในป่าสะแกราช



อีเห็นขางลาย

(ชื่ออื่น : อีเห็นธรรมดา)

Common Palm Civet, Spotted Palm Civet

Paradoxurus hermaphroditus (Pallas, 1777)

Viverridae

Carnivora