



เขียดงูเกาะเต่า เขียดงูสวน

Ichthyophis kohtaoensis Taylor, 1960

Koh Tao caecilian, Common caecilian

เขียดงูเกาะเต่า เขียดงูสวน– *Ichthyophis kohtaoensis* Taylor, 1960

ลักษณะ ลำตัวเรียวยาวคล้ายงู มีปล้องลำตัวจำนวน 360 – 366 ปล้อง ระหว่างปล้องมีร่องพาดขวางลำตัวเฉพาะด้านหลัง นอกจากร่องทางส่วนท้ายของลำตัวที่พาดโดยรอบ หัวและหางเรียวกว่าลำตัว ช่องเปิดหนวดอยู่ใกล้ตามากกว่าช่องเปิดจมูก ตาเล็กแต่มองเห็นได้ชัดเจน

ด้านหลังและด้านท้องสีม่วงอมน้ำตาลเข้ม ร่องระหว่างปล้องสีจางกว่าเล็กน้อย ด้านข้างลำตัวจากครึ่งทางด้านท้ายของขอบปากบนและขอบปากล่างมีแถบกว้างสีเหลืองหรือสีครีมพาดตามความยาวลำตัวไปถึงรูก้นซึ่งอยู่เกือบปลายสุดลำตัว ช่องเปิดหนวด ช่องเปิดจมูก ช่องรูก้น และวงรอบตามีสีเหลือง

การแพร่กระจาย เมียนมาร์ ลาว เวียดนาม กัมพูชา ในประเทศไทยพบทุกภาคของประเทศ ในพื้นที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชพบในป่าดิบแล้ง

พื้นที่อาศัย อยู่ใต้กองใบไม้ค่อนข้างชื้นตามพื้นล่างของป่าดิบแล้งที่อยู่ใกล้ลำห้วย หรือในดินค่อนข้างร่วนซุย

นิสัย ไม่ใคร่พบเห็นตัว เนื่องจากอาศัยอยู่ในโพรงดินหรือตามใต้กองใบไม้ที่อยู่บนพื้นล่างของป่าตลอดเวลา แต่จะพบเห็นตัวบนพื้นดินได้ภายหลังที่ฝนตกหนัก ถ้าในพื้นที่อาศัยมีแหล่งน้ำอยู่ด้วยจะเลื้อยหรือว่ายน้ำได้รวดเร็วมากและจับตัวได้ยาก อาหารหลักเป็นไส้เดือน

สถานภาพ ไม่ได้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2535 และไม่มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ตามกฎหมายของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2005) และตามกฎหมายของ IUCN (2008)