

เหยี่ยวขาว

- ลักษณะ :** เป็นนกนกก่าที่สง่างาม มีขนาดกลาง ลำตัวยาว 28 – 35 ซม. ปากแหลมคม ปลายปากงอจุ่ม หัวใหญ่ คอสั้น ปีกยาว ปลายปีกแหลม ขาและนิ้วแข็งแรง เล็บแหลมคม ลำตัวด้านบนสีเทาอ่อน ตัดกับช่วงไหล่สีดำ ลำตัวด้านล่างสีขาว ทั้ง 2 เพศ ลักษณะเหมือนกัน ลูกนกที่ยังโตไม่เต็มที่คล้ายตัวเต็มวัย แต่ลำตัวด้านบนมีลายสีน้ำตาลอ่อนประปราย ออกสีน้ำตาลอ่อน
- เขตแพร่กระจาย :** แอฟริกา ยุโรปตอนใต้ อินเดีย จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และนิวกีนิ
- ที่อยู่อาศัย :** ทุ่งโล่ง ป่าละเมาะ ทุ่งนา ในป่าสะแกราชพบบริเวณที่โล่ง ทุ่งหญ้าผสมป่าเต็งรัง และ ทุ่งหญ้าผสมป่าปลูก
- อุปนิสัย :** ออกหากินในเวลากลางวัน พบหากินตามลำพัง เวลาหากินมักร่อนกลางอากาศไปเรื่อย ๆ ในระดับที่ไม่สูงนัก ก้มหัวและมองข้างล่างเพื่อหาเหยื่อ ก่อนโฉบลงจับเหยื่อบนพื้นดิน อาหารได้แก่ หนอน กบ เขียด กิ้งก่า จิ้งเหลน สัตว์เลื้อยคลานอื่น ๆ และนกขนาดเล็ก เมื่ออิ่มแล้วมักเกาะพักอยู่ตามกิ่งไม้ในบริเวณแหล่งที่อยู่ของมัน หรือบนสายไฟฟ้าริมถนน หรือใช้เป็นทีเกาะมองหาเหยื่อ
- ผสมพันธุ์ทำรังวางไข่ในช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม และอาจทำรังในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม ทำรังตามยอดไม้ ทำรังแบบง่าย ๆ โดยนำกิ่งไม้มาวางซ้อนกันหลายชั้น ทำตรงกลางให้เป็นแอ่ง ใช้ต้นหญ้าหรือใบไม้มาปูรองรับไข่ วางไข่ครั้งละ 2 – 4 ฟอง ไข่มีสีขาวหรือสีเนื้อ มีลายดอกดวงหรือแถบสีแดงเรื่อ ๆ เกือบทั่วทั้งฟอง พ่อแม่เหยี่ยวช่วยกันฟักไข่ ระยะเวลาฟักประมาณ 26 – 30 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



เหยี่ยวขาว

Black-shouldered Kite

Elanus caeruleus (Desfontaines, 1789)

Accipitridae

Falconiformes