

ເຫັນການຂາຍອນ

**ลักษณะ :** ลำตัวยาว 40 – 46 ซม. เป็นเหี่ยวนินดีเดียวในสกุลเหี่ยวนกเข่า(Accipiter) ที่มีหงอนชนน์ ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลเข้ม บริเวณกระหม่อม หงอนชนน์ และหัวด้านข้าง มีสีเทา ตาสีเหลือง หนังจมูกสีเหลือง ได้คอกสีขาว ตรงกลางมีลายขีดแนวตั้งสีน้ำตาลเข้ม บริเวณอกมีสีน้ำตาลอ่อน มีลายขีดขนาดใหญ่กระจายไปทั่ว บริเวณห้องมีสีขาวมีลายคาดสีน้ำตาล ทางสีน้ำตาล มีลายสีเข้มเกือบดำทั้งด้านบนและด้านล่าง ตัวที่ยังไม่โตเต็มวัย หัวและลำตัวด้านบนสีน้ำตาล กระหม่อมมีลายขีดสีขาวครีม ลำตัวด้านล่างสีขาว มีลายขีดสีน้ำตาลกระเจาอยู่ไปทั่ว ตาสีน้ำตาล

เขตแพร่กระจาย : เทือกเขาหิมาลัย อินเดีย จีนตอนใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะไนหลา อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

ที่อยู่อาศัย : พบทั่วไป ทั้งป้าดงดีบและป้าเบญจพรรณ จากพื้นราบจนถึงระดับความสูง 1800 ม.  
ใบใบโซะแกราชพปิงใบอึ้งรัง แหล่งน้ำใจกลางเมืองน้ำมนต์ใบอึ้งรัง

คุณนิสัย : หากินเวลากลางวัน มักพบโดยเดี่ยวหรือเป็นคู่ เกาะตามกิ่งไม้ใหญ่ ทั้งกิ่งแห้ง และ กิ่งมีเมล็ดนาทีบ อาหารได้แก่ นก กระอก กิ้งก่า แม้ และสัตว์ขนาดเล็กต่าง ๆ คอย จ่องหาเหยื่อ ขณะที่เกาะบนกิ่งไม้หรือบินร่อนกลางอากาศ เมื่อพบเหยื่อจะบินลงมา โฉบด้วยกรงเล็บขันแข็งแรง แล้วนำเหยื่อไปฉีกกินบนต้นไม้ หรือนำกลับรัง

ผสมพันธุ์ช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ทำรังตามรากไม้ รังเป็นแบบง่าย ๆ โดยนำกิ่งไม้มามาวงช้อนกัน ตอกกลางเป็นแอง มีใบไม้สดรองรับไว้ รังอยู่สูงจากพื้นดิน 7 – 15 ม. วางไข่ครั้งละ 2 – 4 พอง พ่อแม่นกผลัดกันฟักไข่ และดูแลลูกนกระยะฟักไข่ 21 – 23 วัน

**สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบริเวณป่าสักแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสักแกราช คือ *Accipiter trivirgatus indicus* ซึ่งเป็นชนิดย่อยเดียวที่พบในประเทศไทย กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคั้มครอง



## เหยี่ยวหนกเข้าหงอน

### Crested Goshawk

*Accipiter trivirgatus* (Temminck, 1824)

Accipitridae

Falconiformes