

เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก

- ลักษณะ :** ความยาวลำตัว 30 – 36 ซม. ลักษณะเด่นคือ ใต้คอมีขีดกึ่งกลางลำคอสีเข้มเห็นเด่นชัด ตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่า และมีสีแตกต่างกันเล็กน้อย ตัวผู้ลำตัวด้านบนสีเทาเข้ม หัวสีดำ ออกและท้องมีสีน้ำตาลแกมแดงและมีลายแถบสีขาว หน้าอกส่วนบนมีลายขีดตามยาวสีดำเล็กน้อย ตัวเมียลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาลเข้ม ตัวที่ยังโตไม่เต็มวัยมีลักษณะคล้ายกับตัวไม่เต็มวัยของเหยี่ยวอื่นในสกุลเดียวกัน แต่ใต้คอมีขีดกึ่งกลางตามยาวเห็นได้ชัด กระหม่อม และท้ายทอยมีสีเข้ม
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย จีนตอนใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไต้หวัน เกาะไหหลำ หมู่เกาะอันดามัน อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
- ที่อยู่อาศัย :** พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง จากพื้นราบจนถึงระดับความสูง 2000 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าเต็งรังริมถนนทางเข้าที่ทำการสถานีฯ
- อุปนิสัย :** หากินเวลากลางวัน กินสัตว์ที่มีขนาดเล็ก เช่น นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพวกกระแต และกระรอก ด้วยการโฉบด้วยกรงเล็บ แล้วนำไปกินตามกิ่งไม้
- ผสมพันธุ์ช่วงฤดูร้อน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ทำรังตามต้นไม้ รังเป็นแบบง่าย ๆ โดยนำกิ่งไม้เล็ก ๆ มาวางซ้อนกันบนง่ามไม้หรือกิ่งไม้ ทำแฉ่งตรงกลางเพื่อรองรับไข่ ไข่มีสีขาวแกมฟ้า วางไข่ครั้งละ 2 – 3 ฟอง ระยะเวลาฟักไข่ 18 – 21 วัน ทั้งพ่อแม่ช่วยกันฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ในป่าสะแกราชพบทำรังบนต้นยางกราด ริมถนนทางเข้าที่ทำการสถานีฯ บริเวณป่าเต็งรัง ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม มีลูกนก 2 ตัว
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



เหยี่ยวนกระจอกเล็ก

Besra

Accipiter virgatus (Temminck, 1822)

Accipitridae

Falconiformes