

นกคู่มอกลาย

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 17 ซม. มีปากเรียวแหลมสีเทา คอค่อนข้างสั้น ปีกมนหางมนและสั้นมาก ขาและนิ้วเท้ามีสีเทา นกตัวเมียตัวโตกว่า และมีสีส้มสดใสกว่าตัวผู้ ตัวเมียลำตัวด้านบนสีน้ำตาล มีลายจุดสีดำและสีขาวกระจายไปทั่ว ใต้คอและอกตอนบนมีสีดำ ลำตัวด้านล่างสีน้ำตาลแดง ด้านข้างมีลายขีดสีดำ ตัวผู้ต่างจากตัวเมียตรงที่ใต้คอมีสีขาว และบริเวณอกตอนบนเป็นลายสีดำ
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย จีนตอนใต้ เกาะไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะชวา เกาะสุมาตรา และฟิลิปปินส์
- ที่อยู่อาศัย :** หุบเขาแห่ง ป่าละเมาะ พื้นที่เกษตรกรรม จากที่ราบจนถึงระดับความสูง 1,500 ม. นป่าสะแกราช พบบริเวณหุบเขาผสมป่าเต็งรังด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่ทำการสถานี ฯ
- อุปนิสัย :** พบหากินตามลำพัง เป็นคู่ หรือเป็นฝูงเล็ก ๆ หากินเวลากลางวันเดินหรือวิ่งหากินไปเรื่อย ๆ ตามพื้นดินแห้ง ๆ ซึ่งมีกอหญ้าหรือไม้พุ่มขึ้นกระจัดกระจาย กินเมล็ดหญ้า เมล็ดพืช หนอน แมลงและสัตว์ขนาดเล็กตามพื้นดิน มันหาอาหาร โดยการคุ้ยเขี่ยตามพื้นดินเช่นเดียวกับพวกไก่ มันบินได้ไม่แข็งแรง สามารถบินได้เพียงระยะสั้น ๆ เท่านั้น ปกติเห็นตัวยาก เพราะมีขนาดเล็กและสีส้มกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม
- ผสมพันธุ์ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม นกตัวเมียจะส่งเสียงร้อง “คู่ม คู่ม” ดังและก้องมาก เพื่อเรียกร้องให้นกตัวผู้เข้ามาหา ทั้งสองจะช่วยกันสร้างรัง โดยเลือกรังอยู่ในกอหญ้า ไกล ๆ โคนต้นไม้ หรือไม้ที่เป็นแอ่งตื้น ๆ บนพื้นดินที่มีใบหญ้า ใบไม้ปิดบังมิดชิด วางไข่ครั้งละ 3 – 5 ฟอง ไข่มีขนาดพอ ๆ กับไข่นกกระทาญี่ปุ่น มีจุดกระและลวดลายเข้ากับสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกัน นกตัวผู้จะเป็นผู้กกไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อนแต่เพียงผู้เดียว ระยะฟักไข่ 12 – 13 วัน ส่วนตัวเมียจะไปจับคู่กับตัวผู้ตัวอื่นอีก
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช
- กฎหมายยังไม่จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าสงวน



นกคุ่มอกตาย

Barred Buttonquail

Turnix suscitator (Gmelin, 1789)

Turnicidae

Gruiformes