

นกเขาไฟ

- ลักษณะ :** นกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 23 ซม. รูปร่างค่อนข้างอ้วนกลม หางสั้น หัวสีเทาแกมฟ้า ลำตัวและปีกสีน้ำตาลแดง หลังคอมีปลอกคอเป็นแถบสีดำ ปลายปีกสีดำ ตะโพกและหางสีเทาคล้ำ ขณะบินมองเห็นแถบสีขาวที่มุมปลายขอบหางทั้งสองข้าง ตัวเมียมีลำตัวและปีกสีน้ำตาลทึบ ๆ
- เขตแพร่กระจาย :** อินเดีย จีน เมียนมาร์ ไทย อินโดจีน เกาะไหหลำ ไต้หวัน หมู่เกาะอันดามัน และฟิลิปปินส์ ในมาเลเซียเป็นนกที่หายาก
- ที่อยู่อาศัย :** อาศัยตามป่าละเมาะ ป่าโปร่ง ทุ่งโล่ง พื้นที่เกษตรกรรม และชุมชนในที่ราบ ในป่าสะแกราชพบบริเวณทุ่งหญ้าผสมป่าเต็งรัง และป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** พบเป็นคู่หรือฝูงเล็ก ๆ มักพบเกาะตามสายไฟฟ้าริมถนน อาจพบเกาะตามกิ่งไม้แห้ง นกเขาไฟสามารถบินได้ดี อาหารได้แก่แมลงพืช และเมล็ดธัญพืชต่าง ๆ เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เป็นต้น หาอาหารโดยเดินจิกกินตามทุ่งนา ทุ่งหญ้า ไร่ หรือพื้นถนน
- ผสมพันธุ์ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม รังเป็นแบบง่าย ๆ รูปร่างคล้ายจานกลม โดยใช้กิ่งไม้เล็ก ๆ หรือต้นหญ้าวางซ้อนกันตามง่ามต้นไม้ ทำแอ่งตรงกลางวางไข่ครั้งละ 2 ฟอง ไข่มีสีขาว พ่อแม่ช่วยกันสร้างรัง ฟักไข่ และเลี้ยงลูกอ่อนระยะฟักไข่ 13 – 14 วัน พ่อแม่ช่วยกันเลี้ยงลูกด้วยน้ำนม เมื่อลูกอายุ 2 สัปดาห์จะแข็งแรงและบินได้ จากนั้นก็จะทิ้งรัง
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ประเทศไทยพบเพียงชนิดย่อยเดียว คือ *Streptopelia tranquebarica humilis*
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกเขาไฟ

**Red Turtle-Dove, Red Collared Dove, Burmese Red Turtle Dove,
Indochinese Red Dove.**

Streptopelia tranquebarica (Hermann, 1804)

Columbidae

Columbiformes