

นกคักคูเหยี่ยวใหญ่

- ลักษณะ :** ลำตัวยาว 44 ซม. มีรูปร่างและสีสันทคล้ายเหยี่ยวนกเขาชิวครา ลำตัวค่อนข้างยาว ปากเรียวเล็ก นกตัวผู้และตัวเมียมีลักษณะคล้ายกัน หัว ทำยทอยมีสีเทา ลำตัวด้านบนและปีกสีน้ำตาลแกมเทา หางด้านบนสีน้ำตาล มีลายแถบสีดำ ปลายหางสีขาว หรือขาวแกมน้ำตาล คางสีดำ ใต้คอสีขาวมีลายขีดสีเทา ออกตอนบนสีน้ำตาลแดง มีลายขีดสีเทา ท้องเป็นลายสีขาวสลับน้ำตาล ลูกนกที่ยังโตไม่เต็มวัย หัวมีลายสีเทาเข้มสลับเทาจาง ลำตัวด้านบนเป็นลายสีน้ำตาลเข้มสลับจาง ลำตัวด้านล่างสีขาว มีลายขีดประสีน้ำตาลแดง
- เขตแพร่กระจาย :** พบบริเวณเทือกเขาหิมาลัย จีนตอนใต้ เกาะไหหลำ ไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะซุนดาใหญ่ ฟิลิปปินส์ และเกาะสุลาเวสี
- ที่อยู่อาศัย :** พบได้ทั้งในป่าผสมผลัดใบ ป่าดิบแล้ง จนถึงป่าดิบเขา ป่าสนเขา จากพื้นราบจนถึงระดับความสูง 2500 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** มักพบโดดเดี่ยว เกาะบนยอดไม้ที่มีใบหนาทึบ วิธีการบินคล้ายเหยี่ยวนกเขาชิวครา ชอบทิ้งตัวลงจากยอดไม้ แล้วขยับปีกอย่างรวดเร็ว 2 – 3 ครั้ง ก่อนที่จะร่อนไปข้างหน้า การบินจะใช้การร่อนเป็นส่วนใหญ่ จากต้นไม้หนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง สามารถเสียงปีกหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่างนุ่มนวล แสดงให้เห็นถึงการบินในที่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาหารของมันได้แก่ แมลง และหนอนแมลง โดยเฉพาะบึ้ง มันจะเที่ยวหาเหยื่อตามกิ่งก้านหรือใบไม้บนต้นไม้ พอพบจะจิกกินทันที และอาจกินผลไม้เล็ก ๆ บ้าง
- นกคักคูเหยี่ยวใหญ่ไม่สร้างรังเอง จะไปแอบวางไข่ในรังของนกอื่น เช่น นกกระรางหัวหงอก นกปลีกกล้วยตาย ฯลฯ ฤดูผสมพันธุ์จึงขึ้นอยู่กับฤดูผสมพันธุ์ของนกเจ้าของรัง คือ ต้นฤดูฝน ไข่มี 2 แบบ คือ สีฟ้าอ่อน และสีน้ำตาล คล้ายไข่ของนกเจ้าของรัง หลังจากวางไข่แล้วปล่อยให้นกเจ้าของรังฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อนให้ ไม่สนใจไข่และลูกอ่อนอีกเลย
- สถานภาพ :** เป็นทั้งนกประจำถิ่นและบางส่วนเป็นนกอพยพมาช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ประเทศไทยพบเพียงชนิดย่อยเดียวคือ *Cuculus sparveroides sparveroides*
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกคักกูเหยี่ยวใหญ่

Large Hawk-Cuckoo

Cuculus sparverioides Vigors, 1832.

Cuculidae

Cuculiformes