

## นกเค้ากู่

- ลักษณะ :** นกเค้ามีหู ลำตัวยาว 23 ซม. ขนตามลำตัวมีสีน้ำตาลออกเทา ๆ หน้าผากมีสีน้ำตาลเข้ม ตัดกับแถบขนเหนือตาจุดคล้ายคิ้ว ซึ่งมีสีเนื้อ หรือสีครีมเห็นได้ชัดเจน หลังคอมีแถบสีเนื้อคาดอยู่ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของนกเค้าชนิดนี้ เมื่อตื่นตกใจ หูจะตั้งชันขึ้นได้ ท้องมีสีน้ำตาลเหลือง มีลายขีดตามยาวสีดำ ดวงตากลมโตสีน้ำตาลเข้ม ปากสั้น งาม แหลม มีสีเหลืองจาง
- เขตแพร่กระจาย :** เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะไหหลำ ได้หวัน หมู เกาะซุนดาใหญ่ และฟิลิปปินส์
- ที่อยู่อาศัย :** พบได้ในป่าทุกสภาพ ไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบ หรือป่าผลัดใบ ป่ารุ่น พุ่มไม้ที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นกระจัดกระจาย หรือแม้แต่ในสวนสาธารณะ สวนผลไม้ ในป่าสะแกราช พบทั้งในป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** ออกหากินเวลากลางคืน ชอบเกาะอยู่บนกิ่งไม้ที่ไม่สูงนัก มักเป็นกิ่งที่ทอดนอนออกไป ค่อนข้างโล่ง สงเสียงร้องไปเรื่อย ๆ เมื่อพบเหยื่อบนพื้นดิน ซึ่งส่วนใหญ่มักเป็นแมลง เช่น ตัวมด แมลงสาบ ตั๊กแตน ผีเสื้อกลางคืน หนูตัวเล็ก ๆ นกตัวเล็ก ๆ และตุ๊กแก มันจะบินลงไปจับด้วยกรงเล็บอันแหลมคมทันที มันบินได้เงียบกริบมาก แม้จนกระทั่งเหยื่อก็ไม่ได้ยิน เพราะขนของมันหนาแน่นอ่อนนุ่มมาก ยังมีประสาทหูที่ดีมาก สามารถรับเสียงที่แผ่วเบาที่สุดได้และรู้ว่าเสียงมาจากทางไหน มันจึงจับเหยื่อได้ง่ายมาก และยังสามารถหันคอไปรอบด้านได้มากกว่า 180 องศา
- ผสมพันธุ์ทำรังวางไข่ ในช่วงฤดูฝนราวเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม วางไข่ตามโพรงไม้ พื้นโพรงรังเต็มไปด้วยขนสัตว์ ขนนก และชิ้นของเหยื่อที่ย่อยไม่ได้ ใช้เป็นวัสดุรองรัง วางไข่ครั้งละ 3 - 4 ฟอง เปลือกไข่สีขาวออกเหลือง นกตัวเมียจะทำหน้าที่กกไข่แต่เพียงลำพังตัวเดียว นกตัวผู้ทำหน้าที่หาเหยื่อมาให้
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยในป่าสะแกราช
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



## นกเค้ากู่

(ชื่ออื่น : นกสูก)

Collared Scops-Owl

*Otus lempiji* (Horsefield, 1821)

Strigidae

Strigiformes