นกตบยุงยักษ์

ลักษณะ : ลำตัวยาว 41 ซม. เป็นนกตบยุงขนาดใหญ่ กระหม่อมสีน้ำตาลมีขนสีน้ำตาลงอกยาว

คล้ายใบหู ลำตัวด้านบนสีน้ำตาล มีลายจุดสีน้ำตาลเข้ม ใต้คอสีดำมีแถบสีขาว หลัง คอมีแถบสีเนื้อ อกช่วงบนสีดำ ลำตัวด้านล่างส่วนที่เหลือเป็นลายแถบสีเนื้อสลับดำ ปีก

และหางไม่มีลายสีขาว หางกว้างมีลายแถบสีน้ำตาลเข้มสลับสีน้ำตาล

เขตแพร่กระจาย : อินเดีย จีนด้านตะวันตกเฉียงใต้ เมียนมาร์ ไทย ลาว เวียดนามตอนใต้ มาเลเซีย เกาะ

สุลาเวสี และฟิลิปปินส์

ที่อยู่อาศัย : อาศัยอยู่ตามป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ชายป่า หรือบริเวณที่โล่งในป่า จากที่ราบจนถึง

ระดับความสูง 1,200 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าเต็งรัง

อุปนิสัย: พบอยู่โดดเดี่ยวหรือเป็นฝูงเล็ก ๆ หากินเวลากลางคืน และช่วงเย็นค่ำ อาหารได้แก่

แมลงต่าง ๆ เช่น ผีเสื้อกลางคืน มวน ด้วงปีกแข็ง แมลงเม่า เป็นต้น หาอาหารโดย หมอบตามพื้นดิน หรือเกาะกิ่งไม้ เมื่อพบเหยื่อ จะบินขึ้น ใช้ปากโฉบจับแมลงกลาง

อากาศ กลางวันจะหมอบพักนอนหลับตามพื้นดิน ตามขอนไม้ หรือตอไม้ในป่า

ผสมพันธุ์ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน มันไม่สร้างรัง แต่ขุดดินบริเวณ พื้นป่า ทุ่งนา ทุ่งหญ้า ให้เป็นแอ่งเล็กน้อย แล้ววางไข่ลงในแอ่ง วางไข่ครั้งละ 1 ฟอง

ไข่มีสีครีม พ่อแม่นกช่วยกันฟักไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน

สถานภาพ : เป็นนกประจำถิ่น พบได้ไม่บ่อยนักในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบ คือ Eurostopodus

macrotis cerviniceps ซึ่งเป็นชนิดย่อยชนิดเดียวที่พบในประเทศไทย

กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกตบยุงยักษ์

Great Eared Nightjar

Eurostopodus macrotis (Vigors, 1831)

Caprimulgidae Caprimulgiformes