

## นกแ่อนตะโพกขาวหางแรก

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาว 19 ซม. ลักษณะคล้ายนกแ่อนบ้าน(House Swift) แต่มีขนาดใหญ่กว่า ปีกยาวกว่า มีหางเป็นแข็งลึก ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแกมดำ ตะโพกมีแถบใหญ่สีขาว ลำตัวด้านล่างเป็นลายจุดและลายแถบสีขาวและดำ คางและใต้คอสีขาว ขณะบินจะคล้ายกับนกแ่อนท้องลาย(Dark-rumped Swift)มาก แต่นกแ่อนตะโพกขาวหางแรกมีใต้โพกเป็นแถบสีขาว
- เขตแพร่กระจาย :** เอเชียตะวันออก الصينเดียว จีน เกาหลี ไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมู่เกาะชุนดามาหยู พิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
- ที่อยู่อาศัย :** พบรตามป่าทั่วไป ป่ารุ่น จากที่รากจนถึงยอดเข้า ในป่าสะแกราชพบบิวณป่าเต็งรัง และบริเวณป่าผสมระหว่างป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง
- อุปนิสัย :** พบรเป็นฝูง และบางครั้งพบรวมฝูงกับนกนางแอ่นมาร์ติน (House Martin) หรือพากนกแ่อนฟ้า (Tree Swift) หากในเวลากลางวัน ใช้เวลาส่วนใหญ่บินและร่อนโฉบจับแมลงกลางอากาศ เมื่อจับเหยื่อได้แล้ว จะกลืนกินทันที
- การสมพันธ์ ยังไม่มีรายงานการทำรังวางไข่ของนกแ่อนตะโพกขาวหางแรก ในประเทศไทย Smythies (1986) รายงานการทำรังวางไข่ของนกชนิดนี้ ในประเทศไทย เมียนمارพบว่า ทำรังเป็นกลุ่มตามถ้ำหินปูน รังทำด้วยใบไผ่ ขันนก และเมล็ดพืชที่หล่นจากต้น เดล瓦เชื่อมตัวยสิ่งที่สะกัดออกจากต่อมน้ำลาย มันเริ่มหากที่สร้างรังเดือนมีนาคม สร้างรังในเดือนเมษายน วางไข่เดือนพฤษภาคม ลูกนกออกจากการให้เดือนมิถุนายน และภายในเดือนกรกฎาคมลูกนกเกือบทั้งหมดจะบินได้
- สถานภาพ :** เป็นนกอยพยัญชนะมาช่วงฤดูหนาว พบรไม่บ่อยในป่าสะแกราช ชนิดอยู่ที่พบรในป่าสะแกราช คือ ชนิดย่อย *pacificus* ซึ่งเป็นชนิดย่อยที่พบรทั่วทุกภาคของไทย ก្នុងหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



ນກແອ່ນຕະໂພກຂາວຫາງແຈກ

**Pacific Swift, Fork-tailed Swift**

*Apus pacificus* (Latham, 1802)

Apodidae

Apodiformes