นกขึ้เถ้าใหญ่

ลักษณะ : ขนาดความยาวลำตัว 30 ซม. ตัวผู้มีขนาดใหญ่ สีเทา หน้ามีลาย

พาดสีดำ อกสีเทา ใต้ท้องและขนคลุมใต้โคนหางมีสีขาว ตัวเมีย

หน้ามีลายพาดสีดำจางกว่าตัวผู้มักมีลายขีดที่ท้อง ลูกนกที่ยังโต

ไม่เต็มวัย มีสีสันคล้ายคลึงตัวเมีย แต่มักมีลายขีดที่อก ท้อง และ

ขนคลุมใต้โคนหาง

เขตแพร่กระจาย: อินเดีย จีนตอนใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะไหหลำ หมู่เกาะ

อันดามัน เกาะชวา

ที่อยู่อาศัย: ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้งที่ค่อนข้างโปร่ง ทุ่งโล่ง จาก

พื้นราบจนถึงระดับความสูง 1,800 ม. ในป่าสะแกราช พบบ่อย

บริเวณป่าเต็งรัง นอกจากนั้นยังพบในป่าดิบแล้ง ป่าปลูก และ

บริเวณทุ่งหญ้าผสมปาเต็งรัง

อุปนิสัย: พบเป็นคู่หรือฝูงเล็ก ๆ 5-6 ตัว เกาะตามยอดไม้หรือกิ่งไม้ ระดับที่

ก่อนข้างสูงอาหารส่วนใหญ่ได้แก่ แมลง โดยจิกกินตามยอดไม้

หรือกิ่งไม้ หรืออาจโฉบจับกลางอากาศ และกินผลไม้บางชนิด

โดยเฉพาะลูกไทร ผสมพันธุ์ช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน ทำรัง

ตามง่ามไม้ในระดับสูง รังเป็นรูปถ้วยหยาบ ๆ วางไข่ครั้งละ 2-3

ฟอง ไข่มีสีเหลือง หรือสีเขียวอ่อน มีลายสีน้ำตาลกระจายทั่วฟอง

ระยะฟักไข่ 14-15 วัน

สถานภาพ: เป็นนกประจำถิ่น พบบ่อยในป่าสะแกราช



นกขึ้เถ้าใหญ่

Large Cuckoo-shrike

Coracina macei (Lesson, 1831)

Campephagidae

Passeriformes