

## นกกระรางสร้อยคอเล็ก

- ลักษณะ :** ความยาวลำตัว 30 ซม. คล้ายนกกระรางสร้อยคอใหญ่ จะงอยปากสีเทาเข้ม หัวสีน้ำตาล มีคิ้วยาวสีขาว หน้าและใต้คอสีขาว มีแถบคาดตาสีดำ แถบสีดำนี้อาบบรรจบกันที่อก ลักษณะคล้ายสร้อยคอ ลำตัวด้านบนสีน้ำตาลแกมเขียว ลำตัวด้านล่างสีเนื้อ สีข้างและโคนหางด้านล่างสีน้ำตาลแดง หางยาว ปลายขนทางด้านนอกมีสีขาว โกลั ปลายหางมีลายแถบสีดำ
- เขตแพร่กระจาย :** พบในเนปาลจนถึง จีนตอนใต้ และเกาะไหหลำ เวียดนาม ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
- ที่อยู่อาศัย** อาศัยตามป่าดงดิบ และป่าโปร่ง จากที่ราบไปจนถึงระดับความสูง 1200 ม. ในป่าสะแกราชพบทั้งในป่าดิบแล้งและป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** พบตามพื้นล่างของป่า เป็นนกที่ชอบสังคม อยู่รวมกันเป็นฝูง มักพบอยู่ร่วมกับนกกระรางหัวหงอก หาอาหารตามพื้นดิน ตามกองใบไม้แห้ง ใช้ปากพลิกใบไม้หาเหยื่อ ซึ่งได้แก่ แมลง ตัวหนอน หอย นอกจากนี้ยังกินสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กและผลไม้ที่ร่วงหล่นตามพื้นดิน อุปนิสัยและพฤติกรรมอื่น ไม่แตกต่างไปจากนกกระรางหัวหงอก
- ผสมพันธุ์ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงเดือนมิถุนายน รังเป็นรูปถ้วย รังทำด้วยกิ่งไม้ขนาดเล็ก ใบไม้ ร่องรังด้วยรากฝอย รังอยู่ตามกิ่งไม้ สูงจากพื้นดินราว 2 – 4 ม. วางไข่ครั้งละ 3 – 5 ฟอง ไข่สีฟ้าเข้ม ไม่มีลาย พ่อแม่ช่วยกันทำรัง ฟักไข่ และเลี้ยงดูลูกอ่อน ระยะฟักไข่ 13 – 14 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ชนิดย่อยที่พบในป่าสะแกราช คือ *Garrulax monileger mouhoti*  
กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกกระรางสร้อยคอเล็ก

**Lesser Necklaced Laughingthrush**

*Garrulax monileger* (Hodgson, 1836)

Timaliidae

Passeriformes