

นกกินปลีดำม่วง

- ลักษณะ :** เป็นนกขนาดเล็กมาก ลำตัวยาว 11 ซม. นกตัวผู้ หัว คอ อกและลำตัวด้านบน มีสีม่วงแกมน้ำเงินเป็นประกาย ท้องสีม่วงออกดำ อก และท้องมีแถบเล็ก ๆ สีน้ำตาลแดง คั้น ช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ มีสีเหมือนตัวเมีย แต่จะมีแถบกว้างสีม่วงจากกลางคอ มายังอกตอนบน นกตัวเมียลำตัวด้านบนสีเขียวแกมน้ำตาล คล้ายตัวเมียของนกกินปลีอกเหลือง(Olive-backed Sunbird) แต่ลำตัวด้านล่างสีเหลืองจางกว่า ปลายหางมีแถบแคบ ๆ สีขาว
- เขตแพร่กระจาย :** พบตั้งแต่ตะวันออกกลางจนถึงอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้นมาเลเซีย
- ที่อยู่อาศัย :** พบตามป่าเบญจพรรณ ป่าละเมาะ พุ่มไผ่ ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** มักพบโดดเดี่ยวหรือเป็นคู่ หากินอยู่บนต้นไม้ที่กำลังออกดอก กินน้ำหวานดอกไม้เป็นอาหารหลัก นอกจากนั้นยังกินแมลงหรือหนอนแมลงบนกิ่งไม้ หรือที่มาตอมดอกไม้ ผสมพันธุ์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน ไข่เป็นรูปกระเปาะ ห้อยลงจากกิ่งไม้ อยู่สูงจากพื้นดินราว 1 – 6 ม. วางไข่ครั้งละ 2 – 3 ฟอง ไข่มีสีเทา, สีขาวแกมเขียว หรือสีน้ำตาล มีลายจุด
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยในป่าสะแกราช ประเทศไทยมีเพียงชนิดย่อยเดียว คือ *Nectarinia asiatica intermedia*
กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง



นกกินปื้ด้าม่วง

Purple Sunbird

Nectarinia asiatica (Latham, 1790)

Nectariniidae

Passeriformes