



นกหัวขวานด่างแกระ

- ลักษณะ :** เป็นนกหัวขวานขนาดเล็กที่สุด ลำตัวยาวเพียง 15 ซม. มีสีดำสลับขาว บริเวณกระหม่อมมีสีเทา ข้างหูมีแถบสีดำ ลำตัวด้านบนสีดำมีลายแถบสีขาว ลำตัวด้านล่างสีขาวหม่น มีลายจุดสีดำกระจายไปทั่ว ตัวผู้มีแถบสีแดงเล็ก ๆ ที่ข้างกระหม่อม
- เขตแพร่กระจาย :** ปากีสถาน จีน เกาหลีเหนือ ไต้หวัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะสุมาตรา และเกาะบอร์เนียว
- ที่อยู่อาศัย :** อาศัยอยู่ตามป่าโปร่ง ป่าดงดิบ ป่ารุ่น ป่าละเมาะ จากที่ราบจนถึงระดับความสูง 1,800 ม. ในป่าสะแกราชพบบริเวณป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** มักพบเป็นคู่ หาดอาหารโดยไต่วนรอบลำต้นหรือกิ่งไม้พร้อมกับใช้ปากจิกและเปลือกไม้ให้หลุด ใช้ลิ้นที่ยาวและเหนียวแหย่เข้าไปตามโพรงหรือรู หรือได้เปลือกไม้แล้วตัวเคี้ยวแมลงเข้าปาก อาหารได้แก่ มด ปลวก ผีเสื้อ หนอนแมลง บางครั้งพบกินผลไม้เปลือกอ่อน เช่น ทุเรียน และน้ำหวานจากดอกไม้ ผสมพันธุ์ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ทำรังตามโพรงไม้ รังอยู่สูงจากพื้นดิน 5-10 ม. วางไข่ครั้งละ 4-5 ฟอง ไข่มีสีขาว ระยะฟัก 12-13 วัน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบในป่าสะแกราช กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง









นกหัวขวานด่างแกระ

Grey-capped Woodpecker

Picoides canicapillus (Blyth, 1845)