

นกขมิ้นท้ายทอยดำ

- ลักษณะ :** ลำตัวยาว 27 ซม. สีตัวส่วนใหญ่เป็นสีเหลืองสดใส มีแถบหนาสีดำคาดจากโคนปากไปจรดก้นที่ท้ายทอย ปีกและหางบางส่วนเป็นสีดำ ปากแหลมแข็งแรงสีส้ม นกตัวเมียสีไม่เหลืองสดใสเหมือนนกตัวผู้ แต่จะเป็นสีเหลืองอมเขียว นกวัยอ่อนมีลายขีดสีดำบริเวณท้อง
- เขตแพร่กระจาย :** เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย หมู่เกาะอันดามัน หมู่เกาะนิโคบาร์ จีน ไต้หวัน หมู่เกาะซุนดา ซูลาเวซี และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ที่อยู่อาศัย :** ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่ารุ่ม สวนผลไม้
- อุปนิสัย :** พบเดี่ยว ๆ เกาะอยู่บนต้นไม้ บินขึ้น ๆ ลง ๆ เป็นลูกคลื่น กินแมลง ผลไม้สุก และน้ำหวานดอกไม้ ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อน วางไข่ครั้งละ 2-4 ฟอง ใช้เวลาฟักไข่ประมาณ 14 วัน
- สถานภาพ :** นกอพยพ คาดว่ามีนกส่วนหนึ่งมีการผสมพันธุ์ในประเทศไทย พบบ่อย









นกขมิ้นท้ายทอยดำ

Black-naped Oriole

Oriolus chinensis (Linnaeus, 1766)