

## นกกินแมลงกระหม่อมแดง

- ลักษณะ :** เป็นนกแก้มขนาดเล็ก ลำตัวอย่าง 18 ซม. จะงอยปากสั้นหนา สีดำ หัวและท้ายสีน้ำตาลแดง สดใส ด้านบนลำตัวสีน้ำตาลแกมเขียว มีแถบคาดตาสีดำเป็นจุดเด่นตัดกับคิ้ว ส่วนแก้มคอ และอกสีขาว บริเวณอกมีลายขีดสีดำกระจาย ท้องและโคนหางด้านล่างสีเนื้อ หางยาว
- เขตแพร่กระจาย :** พบตั้งแต่เนปาล จนถึง จีนตอนใต้ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย และเกาะชวา
- ที่อยู่อาศัย :** อาศัยตามทุ่งหญ้า และป่าโปร่ง จากที่ราบไปจนถึงระดับความสูง 1,400 ม. ในป่าสะแกราช พบบริเวณป่าเต็งรัง
- อุปนิสัย :** มักพบหากินเป็นฝูงเล็ก ๆ ตามกิ่งและใบของไม้พุ่ม ตามพงหญ้า และพุ่มไม้รก ๆ มองเห็นตัวได้ยาก นอกจากได้ยินเสียงร้อง อาหารได้แก่แมลง ผสมพันธุ์ในเดือนเมษายนถึงกันยายน ทำรังตามกอหญ้า รังเป็นรูปทรงกลม ทำด้วยต้นหญ้า กิ่งไม้เล็ก ๆ หรือใบไผ่ วางไข่ครั้งละ 3-5 ฟอง ไข่สีขาว มีลายดอกเล็ก ๆ สีน้ำตาลเข้ม พ่อแม่ช่วยกันทำรัง ฟักไข่ และเลี้ยงลูกอ่อน
- สถานภาพ :** เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อยนักในป่าสะแกราช
- กฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง







นกกินแมลงกระหม่อมแดง

**Chestnut-capped Babbler**

*Timalia pileata* Horsfield, 1821