


นกกินปลีอกเหลือง

- ลักษณะ :** ขนาดเล็ก ตัวยาวประมาณ 11 ซม. รูปร่างเพรียว คอสั้นปากเรียวเล็กยาวและโค้งงอ หลายปากแหลม ลิ้นยาวมากมีลักษณะเป็นหลอด 2 หลอด ตอนปลายสุดของลิ้นแยกออกเป็น 2 แฉก ลักษณะลิ้นแบบนี้มีประโยชน์ในการดูดกินน้ำหวานจากดอกไม้ นกตัวผู้มีสีสวยงามกว่านกตัวเมีย เป็นสีดำเหลืองม่วง ซึ่งมีแถบสีน้ำเงินเหลืองเป็นขอบ บริเวณนี้จะดูเป็นมันวาวเวลาถูกแสงแดด ดูสวยงามมาก ตัดกับสีเหลืองสดของอกตอนล่างและท้องอย่างเห็นได้ชัด นกตัวเมียมีขนด้านล่างเป็นสีเหลืองทั้งหมด มีมีสีดำเหลืองม่วงบริเวณอกและคอ
- เขตแพร่กระจาย :** เมียนมาร์ ไทย อินโดจีน จีนตอนใต้ เกาะไต้หวัน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย หมู่เกาะอันดามัน หมู่เกาะนิโคบาร์ อินโดนีเซีย นิวกินี ออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบได้บ่อยทุกภาค
- ที่อยู่อาศัย :** ป่าผสมผลัดใบที่ค่อนข้างโปร่ง ป่ารุ่น ไร่ สวนผลไม้ สวนสาธารณะ รวมทั้งสวนทุ่มผลไม้รอบ ๆ บ้านพักอาศัย ป่าชายเลน ป่าชายฝั่ง ตั้งแต่ที่ราบจนถึงระดับความสูง 900 ม. ในป่าสระเกษพบได้ทั่วไปบนต้นไม้ที่มีดอก เช่นกล้วยป่า จั้วป่า มะกอกป่า เป็นต้น ชอบเกาะหากินอยู่บนต้นไม้สูง ๆ หือไม้พุ่ม บางครั้งจะลงมาหากินต่ำลงมาถ้ามีดอกไม้กำลังบาน กินน้ำหวานของดอกไม้ แมลงตัวเล็ก ๆ เช่น ค้างคาว แมลงหวี่ มด ตั๊กแตน แมงมุม ตามปกติจะเกาะอยู่ที่ก้านดอกไม้ ๆ โคนดอก แหะปากลงไปดูดน้ำหวานแล้วใช้ลิ้นดูดน้ำหวานมากินจนหมด ถ้าหากดอกไม้ห้อยลงเพราะก้านดอกไม้แข็งแรงพอมันจะใช้วิธีบินนิ่ง ๆ อยู่หน้าดอกไม้ แล้วแหะปากเข้าไปดูดน้ำหวานจากดอกไม้เช่นเดียวกับนกฮัมมิงเบิร์ด (Hummingbird)
- อุปนิสัย :** ผสมพันธุ์และวางไข่เกือบทั้งปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-กันยายน ช่วงที่ทำรังมากที่สุดอยู่ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม รังเป็นรูปกะเปาะทำด้วยเยื่อไม้ รากไม้เล็ก ๆ และใบไม้ห้อยแขวนอยู่ตามปลายกิ่งไม้ วางไข่ครั้งละ 2 ฟอง นกตัวเมียจะเป็นผู้สร้างรังและกกไข่ตามลำพัง ใช้เวลาในการฟักไข่ 14 วัน
- สถานภาพ :** นกประจำถิ่น ที่พบบ่อย







นกกินปลีอกเหลือง

Olive-backed Sunbird

Nectarinia jugularis (Linnaeus, 1766)