นกเขาใหญ่

ลักษณะ : ลำตัวยาว 30 ซม. หัวสีเทา รอบคอด้านหลังมีแถบสีดำ มีจุดสีขาวบนแถบดำนี้เห็นเด่นชัด หลังสีน้ำตาลมีลายขีดสีดำ หน้าอกและท้องส่วนบนมีสีน้ำตาลอมแดง ขนคลุมใต้หางสีขาว จะงอยปากสีดำ ขาสีแดง

เขตแพร่กระจาย : อินเดีย จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกาะไหหลำ ไต้หวัน หมู่เกาะซุนดาใหญ่ หมู่เกาะซุนดาน้อย เกาะปาลาวัน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

ที่อยู่อาศัย : ป่าละเมาะ ทุ่งโล่ง ป่าโปร่ง พื้นที่เกษตรกรรม และบริเวณรอบหมู่บ้าน ตากที่ราบจนถึงระดับความสูง 1,800 ม. ในป่าสะแกราช พบทั้งในป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง และบริเวณป่าผสม

อุปนิสัย : พบเป็นคู่หรือฝูงเล็ก ๆ มักพบเกาะสายไฟฟ้าหรือสายโทรเลขสองข้างถนน หรือเกาะตามกิ่งไม้แห้ง หากินเวลากลางวัน กินเมล็ดธัญพืช เมล็ดของต้นไม้ แมลงและหนอนแมลง นิยมนำมาเลี้ยงกันมาก เนื่องจากมีเสียงร้องที่ไพเราะ “ครู-ครู-ครู” การร้องและการขันเป็นการประกาศอาณาเขตและดึงดูดเพศตรงข้ามเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์ ผสมพันธุ์ราวเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม ทำรังแบบง่าย ๆ บนต้นไม้ รูปร่างคล้ายจาน โดยนำกิ่งไม้เล็ก ๆ และต้นหญ้ามาสานกัน ไข่ครั้งละ 2 ฟอง ไข่มีสีขาว ระยะฟักไข่ 14-15 วัน

สถานภาพ : เป็นนกประจำถิ่น พบไม่บ่อย นักในป่าสะแกราช

นกเขาใหญ่

(ชื่ออื่น: นกเขาหลง)

Spotted Dove

Streptopelia chinensis (Scopoli, 1786)